



#### MONOGRAPHIE

DES

#### PICIDÉES

OU HISTOIRE NATURELLE

DES

#### PICIDĖS, PICUMNINĖS, YUNCINĖS ou TORCOLS

COMPRENANT

DANS LA PREMIÈRE PARTIE,

L'origine mythologique, les mœurs, les migrations, l'anatomie, la physiologie, la répartition géographique, les divers systèmes de classification de ces oiseaux grimpeurs zygodaetyles, ainsi qu'un dictionnaire alphabétique des auteurs et des ouvrages cités par abréviation;

DANS LA DEUXIÈME PARTIE,

La synonymie, la description en latin et en français, l'histoire de chaque espèce, ainsi qu'un dictionnaire alphabétique et synonymique latin de toutes les espèces;

PAR

#### ALF. MALHERBE

CONSEILLER A LA COUR IMPÉRIALE DE METZ; ADMINISTRATEUR DU MUSÉUM DE LA YILLE; PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE LA MOSELLE; ANCIEN PRÉSIDENT DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE;

MEMBRE DE L'INSTITUT DES PROVINCES DE FRANCE, DES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS D'HISTOIRE NATURELLE D'AMSTERDAM, D'ANGERS, DE BERLIN, DE BORDEAUX, DE CATANE, DE DIJON, DE DRESDE, DE FRANCFORT-SUR-MEIN, DE LEIPZIG, DE LIÉGE, DE LILLE, DE LYON, DE L'ILE MAURICE, DE MAYENCE, DE MESSINE, DE NANCY, DE PHILADELPHIE, DE STRASBOURG, DE VALENCE, DE VERDUN, &c., &c.;

AUTEUR DES FAUNES DE LA SICILE, DE L'ALGÉRIE ET DE LA MOSELLE

PLANCHES - VOL. IV

METZ - 1862

Typographie de Jules VERRONNAIS, Imprimeur de la Société d'Histoire naturelle de la Moselle

#### VOL. IV. - PLANCHES.

#### TABLE DES PLANCHES PEINTES

AVEC

#### L'INDICATION DES PAGES RELATIVES A CES PLANCHES DANS LE 11º VOLUME DE TEXTE.

| PLANCHES. | NOMS DES ESPÈCES.   | FIGURES.                               | PAGES.   |
|-----------|---|--|----------|
|           |   |  |          |
|           | / mâle adulte   | 1 (                                    | 75       |
|           | jeune femelle   |  | ))       |
| LXI .     | Mésopie aux taches rouges Mesopicus hæmatostigma femelle adulte |  | 75       |
|           | (Malh.). (Malh. ex Natt.). (autre mâle                          | 1                                      | 75       |
|           | \ quatrième rémige  |  | >>       |
|           | (mâle   |  | 57       |
|           | — à nuque d'or (Malh.) — affinis (Sw.) femelle                  |  | 57       |
|           | ( quatrième rémige  |  | ))       |
| LXII      | mâle  |  | 68       |
| LAII      | — de Sélys (Malh.) — selysii (Malh.) femelle                    |  | 68       |
|           | ( quatrième rémige  |  | »<br>61  |
|           | — passerin (ex Linn.). — passerinus (Linn.) (mâle femelle       |  | 61       |
|           | — passerin (ex Linn.). — passerinus (Linn.) . Teinene           |  | 01<br>»  |
|           | mâle  |  | 44       |
|           | — du Cap (Less.) — capensis (Linn.) · . femelle                 |  | 4.4      |
|           | quatrième rémige  |  | ))       |
|           | mâle  |  | 46       |
| LXIII     | - goertan (ex Gmel.) goertan (Gm.) femelle                      |  | 46       |
|           | quatrième rémige  | 5                                      | ))       |
|           | (mâle,  |  |          |
|           | — poliocéphale (Malh.). — poliocephalus (Rup.) femelle          |  |          |
|           | ex Sw.). quatrième rémige                                       |  | ))       |
|           | mâle  |  | 78       |
| LXIV      | Indopie sultan (Malh. ex Indopicus sultaneus (Hogd.) femelle    | <b>2</b>                               | 79       |
|           | Hodgs.). (quatrième rémige                                      | 3                                      | ))       |
|           | - de Delessert (Mallı.) - delesserti (Mallı.) femelle           | 4                                      | 79       |
|           | mâle  | 5                                      | 79       |
|           | mâle  | 1                                      | 85       |
|           | fenielle  |  | 85       |
| LXV       | — platuek (Less.) — strictus (Hors.)} jeune mâle, variété .     |  | 85       |
|           | quatrième rémige  | 4                                      | >>       |
|           | \ patte   | 5                                      | ))       |
| LXVI      | — de Goa (Valene.). — goensis (Gmel.)                           | 1                                      | 85       |
|           | ( remene  | $\frac{2}{2}$                          | 85       |
|           | — des Philippines (Les.) — philippinarum (Son.) mâle. · · · · · | 5                                      | 86       |
|           | ( iemelie   | 4.                                     | 87       |
|           | mâle  | $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ | 88       |
|           | Charlette (Wells) agriculta (Wells) jeune                       | 5                                      | 89<br>89 |
| LXVII     | — Charlotte (Mallı.) . — carlotta (Mallı.) . · femelle          | 4                                      | 89       |
|           | rémige primaire   | 5                                      | 89       |
|           | rémige secondaire   | 6                                      | "        |
|           | mâle  | 1                                      | 85       |
| TXXXIII   | \ ionnoAl.  | $\frac{1}{2}$                          | 85       |
| LXVIII    | — sphilolophe (Less.). — hæmatribon (Wagl.) femelle             | 5                                      | 85       |
|           | quatrième rémige  | 4.                                     | »        |

|     |            |  |       | I .                                    |            |
|-----|------------|--|-------|--|------------|
|     | PLANCHES.  | NOMS DES ESPÈCES.  |       | FIGURES.                               | PAGES.     |
|     |            | / mâle   | 0 .   | 1                                      | 91         |
| ı   | LXIX       | Politico de la constante de la |       | 2                                      | »          |
|     | LAIA       | Brahmapic à dos rouge Brahmapicus erythronotus femelle   |       |  | 91         |
|     | <b>"</b> O | (Vieiii.). (quatrième rémige<br>(mâle  |       | 5                                      | »          |
|     |            | — du Bengale (Buff.) . — bengalensis (Linn.). femelle  |       |  | 95<br>96   |
| Ĭ   |            | quatrième rémige   |       |  | »          |
| Ī 3 |            | (femelle   |       | 1                                      | 92         |
| 7   | LXX        | — puneticol (Malh.) . — puncticolli (Malh.) . mâle   |       |  | 92         |
| ı   |            | quatrieme remige   |       | 3                                      | »          |
|     |            | Chloropicoïde à croupion <i>Chloropicoïdes rubropygia</i> -   femelle  | ٠.    | 5                                      | »<br>100   |
|     |            | rouge (Malh.). lis(Malh.).   | • •   |  | 100        |
|     |            | ( mâle   |       | 1                                      | 101        |
|     | LXXI       | — de Shore (Malh.) . — shorii (Malh.) femelle  |       |  | 102        |
|     |            | / quatrieme remige   |       |  | ))         |
|     |            | patte mâle   |       |  | 98         |
|     |            | — tiga (Raffles) — tigæ (Raffl.) femelle   |       | 6                                      | 98         |
|     |            | quatrième rémige   |       | 7                                      | »          |
|     |            | (mâle  |       | 1                                      | 103        |
|     | LXXII      | — de Raffles (Vig.) — rafflesii jeune mâle   | • •   | $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ | 104        |
|     |            | quatrième rémige   |       | 4                                      | 104<br>»   |
|     |            | — grantia (M° Clell.). — grantia (mâle   |       | 5                                      | 105        |
|     |            | femelle,   |       | 6                                      | 105        |
|     | TACAZITI   | mâle   |       | 1                                      | 107        |
|     | LXXIII     | Chloropie à nuque jaune Chloropicus flavinucha (G.) femelle jeune femelle  | •     | $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ | 107<br>107 |
|     |            | (Malh.). Jeune femelle quatrième rémige  |       |  | 107        |
|     |            | mâle   |       |  | 109        |
|     | LXXIV      | - à huppe verte (Mal.) - chlorolophus (Vioil) femelle  |       | 2                                      | 110        |
|     |            | Jeune male   |       | 5                                      | 110        |
|     |            | quatrième rémige   |       | 5                                      | »<br>111   |
|     |            | — grenadin (Temm.). — puniceus (Horsf.) femelle  |       | 6                                      | 112        |
|     |            | quatrième rémige   |       | 7                                      | »          |
| ı   | LXXV       | — xanthodère ou à nu- — xanthoderus (Malh.). mâle femelle  |       | 1                                      | 115        |
|     | 332121     | — xanthodere ou à nu-<br>que jaune (Malh.) — xanthoderus (Malh.). femelle quatrième rémige   |       | $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ | 115<br>»   |
|     |            | / mâle.  |       | 4                                      | 113        |
|     |            | — gorgeret (Temm.) . — mentalis (Temm.) .} femelle   |       | 5                                      | 115        |
|     |            | quatrième rémige   |       | 6                                      | >>         |
|     | LXXVI      | — minium (Less.) — miniatus (Forster) . femelle  | • . • | $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ | 117        |
|     |            | — minium (Less.) — miniatus (Forster) . femelle quatrième rémige   | • •   | 3                                      | 117<br>»   |
| ı   |            | ( femelle variété  |       | 4                                      | 154        |
|     |            | — mediastin (Temm.). — dimidiatus   mâle adulte  |       | 5                                      | 155        |
|     |            | ( femelle adulte   |       | 6                                      | 133        |
|     | LXXVII     | — striolé (ex Blyth) — striolatus femelle  | • •   | $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ | 155<br>155 |
|     |            | quatrième rémige   |       | 5                                      | » .        |
|     |            | / mâle   |       | 4                                      | 150        |
|     |            | — oeeipital (Vig.) — occipitalis femelle   |       | 5                                      | 130        |
|     |            | ( quatrième rémige<br>( mâle adulte,   | • •   | 6                                      | »<br>151   |
|     | LXXVIII    | — éeaillé (ex Less.) . — squamatus jeune mâle  |       | $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ | 151        |
|     |            | femelle  |       | 5                                      | 152        |
|     |            | quatrième rémige   |       | 4                                      | »          |
|     |            | mâle femelle   |       | $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ | 121<br>121 |
|     | LXXIX      | - vert (Malh.) viridis jeune femelle   |       | 5                                      | 121        |
|     |            | jeune mâle   |       | 4                                      | 121        |
|     |            | quatrième rémige   |       | 5                                      | »          |
|     | LXXX       | — avokera (Malh. ex — avokera femelle  |       | 1 2                                    | 128<br>128 |
|     |            | Temm.). quatrième rémige   |       | 5                                      | 128        |
|     |            | - 1-mige   |       |  |            |

| PLANCHES.    | NOMS DES ESPÈCES.   | FI GURES.                                   | PAGES.                 |
|--------------|---|---|------------------------|
| LXXX         | Chrysopic de Guérin (Mallı.) Chrysopicus guerini femelle  | 4 5   | 127<br>127             |
|              | quatrième rémige ( mâle   | 6   | »<br>125               |
| LXXXI        | — cendré (Temm.) — canus (Gmel.) femelle quatrième rémige   | $\frac{2}{5}$                               | 125                    |
| LXXXII       | — Levaillant (Malh.) . — vaillantii (Malh.).<br>  mâle femelle adulte jeune mâle quatrième rémige | 2<br>5                                      | 125<br>125<br>125<br>) |
| LXXXIII      | — multibandes (Mallı.) — polyzonus (Temm.). mâle quatrième rémige                                 | 1<br>2<br>5                                 | 157<br>157<br>»        |
|              | — capistrate (ex Natt.) — capistratus (Natt.) : femelle quatrième rémige                          | 5<br>6                                      | 140<br>141<br>»<br>142 |
| LXXXIV       | — elrysochlore (Vieil.) — <i>chrysochlorus</i> (Vieil.) femelle quatrième rémige                  | 2<br>5                                      | 142<br>»               |
|              | — brun dorć (ex Vieil.) — aurulentus (Illig.) : femelle quatrième rémige                          | - 5<br>6                                    | 159<br>140<br>»        |
| LXXXV        | — du Brésil (ex Sw.) . — brasiliensis (Sw.) : \begin{cases} mâle                                  | $\frac{2}{5}$                               | »<br>»<br>146          |
|              | — d'Isidore (Mallı.) . — leucolæmus (Natt.) . femelle quatrième rémige rémige secondaire          | - 1   | 146<br>»<br>»          |
| LXXXVI       | — poignardé (Tem.) . — percussus (Temm.) . femelle quatrième rémige                               | 1<br>2<br>5                                 | 148<br>148<br>»        |
|              | — à gorge jaunc (Malh.) — chlorocephalus (Gm.) mâle, femelle                                      | 4<br>5<br>6<br>7                            | 144<br>145<br>145<br>» |
| LXXXVII      | — à gorgerouge (Malh.) — erythropsis (ex Vieil.) femelle  | 1<br>2<br>5<br>4-5                          | 145<br>145<br>»<br>180 |
|              | — de Cayenne (ex Val.) — cayennensis (ex Gm.) femelle quatrième rémige                            | 6<br>7                                      | 180<br>»               |
| LXXXVII bis. | — chloris (Malh.) — chlorosostus (Wagl.). femelle quatrième rémige                                | 1<br>2<br>5                                 | 184<br>185<br>»        |
|              | mélanoelilore (Malh.) - melanochlorus (Gm.) feinelle quatrième rémige                             | 5 6   | 188<br>189<br>»        |
| LXXXVIII     | — ieteromèle (Malh.). — ieteromelas (Vieill.). femelle quatrième rémige                           | 1<br>2<br>5                                 | 185<br>185<br>»        |
|              | — à eou noir (Mallı.). — atricolli (Mallı.)   mâle  | 4   | 178<br>190             |
| LXXXIX       | — elirysomèle (Malh.). — chrysomelas (Malh.). femelle quatrième rémige                            | $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$ | 190<br>»<br>175        |
|              | — rubigineux (ex Sw.). — rubiginosus (Sw.) } femelle quatrième rémige                             | 5   | 176<br>»               |
| d portion    | — à gorge noire (Malh.) — melanolæmus (Malh.) femelle quatrième rénige                            | 8 9   | 186<br>186<br>»        |
| XC           | — œrugineux — œruginosus (Lieht.). femelle quatrième rémige                                       | 1<br>2<br>5<br>4                            | 172<br>172<br>»<br>175 |
|              | — grisonnant (Malh.). — canipileus (Lafr. et femelle  | 5<br>6<br>5                                 | 174<br>174<br>»        |

| PLANCHES. | NOMS DES ESPÈCES.   | FIGURES.                               | PAGES.                                     |
|-----------|---|--|--|
| XCI       | Chrysopie du Gabon (Malh.) Chrysopicus gabonensis femelle   |  | 150<br>150                                 |
|           | (Mallı, ex Verr.). (quatrième rémige  | 5                                      | »<br>158                                   |
|           | — du prince Charles. — caron (main.) · · · (quatrième rémige  | 5                                      | »  |
|           | — à bec court — brachyrhynchus(Sw.) mâle femelle  | 7                                      | 155<br>155                                 |
| xcII      | quatrième rémige  — neigeux (Mallı ex Sw.) — nivosus (Sw.) ( mâle,  |  | »<br>151                                   |
|           | — à dos vert — chloronotus (Val.) .   femelle   | 2<br>5                                 | 151<br>156                                 |
|           | mâle  | 4                                      | 164  |
|           | — pointillé (Malh.) — punctuligerus (Wag.) jeune femelle  | 6                                      | 165<br>165                                 |
| xcm       | quatrième rémige — de Bruee (Malh.)   |  | »<br>170                                   |
| 7.7       | mâle femelle  | 2                                      | 160<br>161                                 |
| Id.       | jeune mâle  | 4                                      | 161  |
| et        | — æthiopien ou tacheté — <i>æthiopicus</i> (Ehrenb.)) jeune femelle de Nubie (Buff.). ex <i>nubicus</i> (Wagl.)) quatrième rémige |  | ))   |
| XCIV      | mâle  | 1                                      | 160  |
|           | femelle   | 3                                      | 161<br>»                                   |
|           | — à queue dorée (Malh.) — chrysurus (Sw.) ( mâle femelle  | 4<br>5                                 | 155<br>155                                 |
|           | quatrième rémige  | 6                                      | ))   |
| XCV       | — d'Abington — abingoni (Smith.) femelle  | $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ | 166<br>167                                 |
|           | quatrième rémige  | 3<br>4                                 | »<br>162                                   |
|           | — tigre (Levaill.) — notatus (Licht.)} femelle  | 5                                      | 165  |
|           | — mouelieté (Voir à la Pl. cxiv).   | 6                                      | ))   |
|           | vieux mâle  | 1                                      | 216  |
| XCVI      | Mélampie Lewis (Wils.) Melampicus torquatus (Aud.) femelle  | $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ | $\begin{array}{c} 216 \\ 216 \end{array}$  |
|           | femelle adulte jeune femelle  | 4 5                                    | 216<br>217                                 |
| XCVII     | mâle adulte   | 1                                      | 213  |
|           | — erythrocephale — erythrocephalus jeunes femelles quatrième rémige   | 2-5                                    | 215  |
|           | — de Porto-Rieo (Maug.) — porto-ricensis (Daub.) mâle quatrième rémige  | 5                                      | 206  |
| XCVIII    | (mâle   | 6                                      | 197  |
|           | quatrième rémige  | 2<br>5                                 | 198  |
|           | mâle  | 4 5                                    | 194<br>194                                 |
|           | jeune mâle  | 6                                      | 194  |
|           | quatrième rémige ( mâle   | 7                                      | »<br>201                                   |
| XCIX      | — formicivore (Less.). — formicivorus jeune femelle   | 2 5                                    | 202<br>202                                 |
|           | quatrième rémige  | 4                                      | »  |
|           | — à gorge jaune (Malh.) — flavigula (Natt.) femelle   | 5                                      | 204<br>204                                 |
| C         | — l'Herminier (Less.). — herminieri (Less.).   mâle   | 4                                      | »<br>199                                   |
|           | — à front jaune (Vieil.) — flavifrons femelle   | 2-5                                    | $\begin{bmatrix} 208 \\ 209 \end{bmatrix}$ |
|           | — à gorge citrine (Mallı.) — xantholarynx (Reic.)   mâle  | 5<br>6                                 | 205  |
| CI        | — dominicain (Malh. — dominicanus (Vieill.) mâle femelle  | 1 2                                    | 219<br>219                                 |
| 1         |   | -                                      |  |

| CI    |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| CI    |  |  |  |
| (AL   | Xénopie à masque blane Xenopicus albolarvatus.   mâle femelle quatrième rémige                               | 4                                      | 222<br>222<br>»                              |
| CIT   | mâle   | 1                                      | $egin{array}{c} z_24 \\ z_25 \\ \end{array}$ |
| CII   | Piezèbre superciliaire (Malh. Zebrapicus superciliaris. ex Temm.). (Temm.). quatrième rémige variété blanche | 5                                      | »<br>225                                     |
|       | — élégant (ex Sw.) — $elcgans$ (Sw.) $femelle$ quatrième rémige  | 6                                      | 226<br>226                                   |
| CIII  | — Pueherand (Malh.). — pucherani (Malh.) . femelle   | $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ | »<br>227<br>228                              |
|       | quatrième rémige   |  | »<br>250                                     |
|       | — alezan cendré (Mallı.) — hypopolius (Malh.) .} femelle quatrième rémige                                    | 6<br>7                                 | 250<br>»<br>256                              |
|       | — earolin (Val.) — carolinus (Linn.) } femelle quatrième rémige  | 8 9                                    | 257<br>»                                     |
| CIV   | - à front d'or (Malh. — aurifrons (Lieht.).   mâle   femelle   jeune mâle                                    | 1<br>2<br>5                            | 240<br>241<br>241                            |
|       | quatrième rémige — de la Jamaïque (Buff.) — radiolatus (Wagl.) femelle                                       | 4<br>5<br>6                            | 259<br>259                                   |
|       | quatrième rémige   | 7                                      | 244  |
| CV    | — aux yeux rouges — erythrophthalmus femelle quatrième rémige  | 2<br>5                                 | 245  |
|       | — Santa-Cruz (ex Bp.) — Santa-Cruzi (Bp.) . mâle quatrième rémige  | 5<br>6                                 | 242<br>245<br>»                              |
| CVI   | — trieolor (Wagl.) — tricolor (Wagl.) femelle quatrième rémige   | 1<br>2<br>5                            | 248<br>248                                   |
|       | — de Kaup (Malh.) — kaupii (Bp.) femelle   | 5                                      | 246<br>246                                   |
| CVII  | — à ventre sanguin (Sw.) — rubriventris (Sw.) : mâle quatrième rémige quatrième rémige                       | 6 1 2                                  | »<br>249<br>»                                |
|       | — de Saint-Domingue — striatus (Gmel.) femelle   | 5 4                                    | 255<br>255                                   |
| CVIII | (Malh.). (quatrième rémige   | 5<br>1<br>2                            | 255<br>255                                   |
|       | quatrième rémige   | 5 4                                    | »<br>254                                     |
|       | — agricole (Mallı.) — agricola (Mallı.) femelle quatrième rémige   | 5                                      | 255<br>»                                     |
| CIX   | — ehrysoïde (Malh.) . — chrysoïdes (Malh.) . jeune mâle aile   | 1<br>2<br>5                            | 262  |
|       | femelle  | 5 6                                    | 262<br>258<br>259                            |
|       | jeune mâle   | 7                                      | 259<br>266                                   |
| CX    | — mexicanoïde (Lafr.) — rubicatus (Wagl.) femelle quatrième rémige   | 2<br>5<br>4                            | 267<br>»<br>264                              |
|       | _ mexicain (Malh. ex — mexicanus (Sw.) femelle quatrième rémige  | 5<br>5                                 | 265<br>»                                     |
| CXI   | laboureur (Levaill.) — araior (G. Cuv.) femelle quatrième rémige   | 1<br>2<br>5                            | 275<br>275<br>»                              |

| PLANCHES.   | NOMS DES ESPÈCES.  | FIGURES.                               | PAGES.                                    |
|-------------|--|--|---|
|             | ( mâle   | 4.                                     | 270                                       |
| CXI         | Géopie chilien (ex Less.). Geopicus chilensis (Garn. et femelle  |  | 270                                       |
|             | Less.). quatrième rémige.  | 6                                      | ))  |
|             | mâle   |  | 268                                       |
|             | femelle  |  | 268                                       |
| CXII        | — rivoli (Malh.) — rivolii (Boiss.) jeune mâle   |  | 268                                       |
|             | jeune femelle quatrième rémige   |  | 268                                       |
|             | mâle   |  | 272                                       |
| CXIII       | — des rochers (d'Orb.) — rupicola (d'Orb.) femelle   |  | 272                                       |
| GZZZZZ      | quatrième rémige.  | 3                                      | )   |
|             | Commending (Vic.) (mâle  | 4                                      | 278                                       |
|             | — fernando (ex Ram. — fernandinæ (Vig.) : femelle  |  | 273                                       |
| CXIV        | Chrysonie moucheté (Malh.) Chrysonicus perspicillatus (mâle  | 1                                      | 17  |
|             | (Lient.).  |  | 172                                       |
|             | Mélampie à eollier (Malh.). Melampicus torquatus jeune femelle   | 5                                      | :   |
| CXV         | Pieumnoïde abnorme (Tem.) Pieumnoïdes abnormis (Bur.) femelle  | 1                                      | 280                                       |
|             | Pieumne tacheté de blane Picumnus albo-squamatus mâle  | 2                                      | 28  |
|             | (d'Orb.). (de Lafresn.).   mâle  | 5                                      | 28  |
|             | — pygmée (Lieht.) — pygmæus (Lieht.) femelle   |  | 28  |
|             | jeune male   | 5                                      |   |
| CXVI        | Tammingkii (do Lafr) mâle  |  | 27  |
| CZX V I     | — Temminek (Lafr.) . — temminekii (de Lafr.) femelle   | 2                                      | 27  |
|             | *— délié (Malh.) — $exilis$ (Lafresn.) $\begin{cases} mâle. & . & . & . \\ femelle. & . & . \end{cases}$ | 5                                      | 29  |
|             | / m åla  | $\frac{6}{7}$                          | 29<br>28                                  |
|             | **— de Buffon (Lafresn.). — buffonii (de Lafresn.) femelle.  | 5<br>4                                 | 28  |
|             |  | 1                                      | 28  |
| CXVII       | — Castelnau (Malh.) — castelnau (Malh.) inâle jeune mâle   | <b>2</b>                               |   |
|             | \ mâle   | 3                                      | 283                                       |
|             | remene   | 4                                      | 285                                       |
|             | — innommé (Malh.) — innominatus (Burton) mâle  | 5                                      | 27  |
| CXVIII      | ( iemeile  | 6                                      | 279                                       |
| GAVIII      | AT AT  | $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ | $\begin{array}{c} 284 \\ 283 \end{array}$ |
|             | — a ventre roux (Math.) — rupventris (Bonap.). male  | 5                                      | 400                                       |
|             | AT   | 4                                      | 28:                                       |
|             | — Lafresnaye (J. Ver.) — $lafresnayi$ (Malh.) $\begin{cases} male. \\ femelle. \end{cases}$              | 5                                      | 28  |
| CXIX        | — à dessous jaune (Mal.) — hypoxanthus (Reich.) famelle  | 1                                      | 29  |
| C4. V Z 1 X | ( temene   | 2                                      | 29  |
|             | — à gouttelettes (Malh.) — guttatus (Reieli.) femelle  | 5                                      | 29  |
|             | — vermillon ou eouleur — cinnamomeus (Wagl.) mâle de eannelle (Malh.)                                    | 5                                      | 277<br>277                                |
|             | de eannelle (Malh.) ( niâle  | 1                                      | 280                                       |
| CXX         | — de Cayenne (Lafresn.) — cayennensis (Gm.) . femelle  | $\frac{1}{2}$                          | 280                                       |
|             | jeune mâle   | 5                                      | )   |
|             | — olivâtre (Malh.) — olivaceus (Lafresn.) ( mâles  | 4-5                                    | 295                                       |
| CVVI        | ( iemelle  | 6                                      | 29  |
| CXXI        | Toreol à plastron (Malli.) . Yunx pectoralis (Vig.)  | 1                                      | 294                                       |
|             | — de l'équateur (Mallı.) — aquatorialis (Rüpp.)  | $\frac{2}{5}$                          | 294                                       |
|             | - vertieille (Briss.) — torquilla  | 5 4                                    | $\begin{array}{c} 292 \\ 289 \end{array}$ |
|             | ,  | ale                                    | 400                                       |

Rectifier sur la Pl. CXVI, Picumne délié, au lieu de: Fig. 3, mâle; Fig. 4, femelle; — lisez: Fig. 5, mâle; Fig. 6, femelle.

— Picumne de Buffon, au lieu de: Fig. 5, mâle; Fig. 6, femelle; — lisez: Fig. 3, mâle; Fig. 4, femelle.

Pl. CXVIII, Picumne a ventre roux, au lieu de: Fig. 2, femelle; — lisez: Fig. 2, mâle.



Mesnel, del et Lath.

MÉSOPIC de SÉLYS (Malh.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, remige 4.º. MÉSOPIC PASSERIN Ex Linn.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4.º. MÉSOPIC (Malh.) du Cap (Less.) f.7, mâle; f. 8, femelle; f. 9, rémige 4.º.

Paris, Lith. Compan, rue Rousselet, 15.

A. Malherbe, direx<sup>t</sup>

MESOPICUS SELYSII (Malh.)
MESOPICUS PASSERINUS (Linn.)
MESOPICUS CAPENSIS.



Mesnel, del et Lith.

MÉSOPIC GOER'TAN (Ex Gmel.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4.º MÉSOPIC POLIOCÉPHALE (Malh.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4.º

A. Malherbe, direx.t

MESOPICUS GOERTAN (6m.)
MESOPICUS POÏCEPHALUS (Rupp.ex Sw.)





Mesnel, del et Lith.

INDOPIC (Malh.) SULTAN (exhodgs.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4º. INDOPIC de DELESSERT (Malh.) f. 4, femelle; f. 5, mâle.

A . Malherbe , direx $^t$ 

INDOPICUS SULTANEUS. INDOPICUS DELESSERTI.



Mesnel, del et Lith.

INDOPIC (Malh.) PLATUCK(Less.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, j. mâle; var. f. 4, rémige 4 f. 5, patte. INDOPICUS STRICTUS (Hors.)



Mesnel, Del & Lith

INDOPIC (Malh.) de GOA (Valenc.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle. INDOPIC des PHILIPPINES (Less.) f.3, mâle; f. 4, femelle.

INDOPICUS GOENSIS (Gmel) INDOPICUS PHILIPPINARUM (Sonner)

Paris, Lith Compan, r Rousselet, 15.



Mesnel, del et Lith.

Malherbe, direx.t

INDOPIC CHARLOTTE (Malh.) fig 1, mâle; f. 2, mâle moins adulte INDOPICUS CARLOTTA.
f. 3, jeune, f. 4, femelle, f. 5, rémige primaire; f. 6, rémige secondaire.



Mesnel, del et Lith.

INDOPIC SPHILOLOPHE (Less.) fig. 1, mâle, f. 2, j. mâle

f. 3, femelle, f. 4, rémige 4°.

Malherbe, dirext

INDOPICUS (Malh) HŒMATRIBON (Wagl.)



BRAHMAPIC (Malh) A DOS ROUGE (Vieill.) fig. 1, mâle;
fig. 2, autre mâle fig. 3, femelle; fig. 4, remige 4 °.
BRAHMAPIC DU BENGALE (Buff) fig. 5, mâle; fig. 6, femelle; fig. 7, remige 4 °.

BRAHMAPICUS ERYTHRONOTUS (Vieill) )
BRAHMAPICUS BENGALENSIS (Linn)

Paris Lith Compan rue Rousselet 15



Mesnel, Del & Lith.

A. Malherbe, Dirext

BRAHMAPIC PUNCTICOL (Malh.) fig. 1, femelle; f. 2, mâle; f. 3, rémige 4f. f. 4, la patte. BRAHMAPICUS PUNCTICOLLI (Malh.) CHLOROPICOÏDE à CROUPION ROUGE (Malh.) f. 5, femelle. CHLOROPICOÏDES RUBROPYGIALIS (Malh.)



Mesnel, del & Lith.

CHLOROPICOÏDE DE SCHORE (Malh.) fig. 1, mâle, f. 2 femelle

"
f. 3, rémige 4° f. 4, palle.

CHLOROPICOÏDE TIGA (Raffle.) f. 5, mâle; f. 6, femelle, f. 7, rémige 4°

CHLOROPICOÏDES TIGAE(Raffle.)

CHLOROPICOIDES SCHORII (Malh.)

 $\it Malherbe$ ,  $\it direx^t$ .

Paris, Lith. Compan, r. Rousselet, 15.





Mesnel, Del, & Lith.

CHLOROPICOÏDE de RAFFLES (Vig.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle, f. 3, j. mâle; f. 4, rémige 4°.
CHLOROPICOÏDE GRANTIA (M°. Clell.) f. 5, mâle; f. 6, femelle.

A . Malherbe ,  $Direx^t$ 

CHLOROPICOÏDES RAFFLESII.
CHLOROPICOÏDES GRANTIA.



Mesnel, Del & Lith.

CHLOROPIC à nuque jaune (Malh) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, j femelle; f. 4, rémige 4°

A. Malherbe , Direx!

CHLOROPICUS FLAVINUCHÂ (Gould)

### PL.LXXIV



Mesnel, Del & Lith.

A. Malherbe,  $Direx^t$ 

CHLOROPIC à huppe verte (Malh.) fig 1, mâle; f. 2, femelle, f. 3, j. mâle; f. 4, rémige 4°.

CHLOROPIC GRENADIN (Temm.) fig. 5, mâle; f. 6, femelle, f. 7, rémige 4°.

Paris Lith. Compan r Rousselet, 15.

CHLOROPICUS CHLOROLOPHUS (Vicili)
CHLOROPICUS PUNICEUS (Horsf.)



Mesnel del et Lith

A. Malherbe direx!

CHLOROPIC XANTHODÈRE (Malh) fig.1, mâle; f.2, femelle; f.3, rémige, 4.º CHLOROPIC GORGERET (Temm). f.4, mâle; f.5, femelle; f.6, rémige; 4.º

CHLOROPICUS XANTHODERUS(Malh) CHLOROPICUS MENTALIS(Temm)



CHLOROPIC MINIUM (Less.) fig 1 mâle: f. 9, femelle, f. 3 rémige 4°. — CHLOROPICUS MINIATUS (Farst.) CHLOROPIC MÉDIASTIN. (Temm.) f. 4, femelle variété, f. 5, mâle, f. 6, femelle. CHLOROPICUS DIMIDIATUS (Temm.)



CHLOROPIC STRIOLL: Ex Blyth. i.g. 1, mâle, f. 2, femelle, f. 3, rémige 4.º.

CHLOROPIC OCCIPITAL, f. 4, mâle; f. 5 femelle, f. 6, rémige 4.º.

CHLOROPICUS STRIOLOTUS (Blyth.)
CHLOROPICUS OCCIPITALIS (Vigors)



CHLOROPIC EGAILLÉ (Ex.Less.) fig 1 mâle; f.2. j. mâle, f.3, femelle; f.4, rémige 4.º

CHLOROPICUS SQUAMATUS (Vigors)



Mesnel del et Lith

A. Malherbe, direx.16

CHLOROPIC VERT, .(Malh) fig.1, mâle; f.2, femelle.
f. 3, J male; f.4, J. femelle: f. 5, rémige, 4°

CHLOROPICUS VIRIDIS



CHLOROPIC AWOKERA (Malh ex Temm) fig.1, male, f.2 femmelle; f.3, remige 4.º CHLOROPIC DE GUÉRIN (Malh) f.4, mâle; f.5, femelle; f.6 rémige 4.

CHLOROPICUS AWOKERA
CHLOROPICUS GUERINI




Mesnel, del. & lith

A. Malherbe, direx.t

CHLOROPIC CENDRÉ (Temm.) f. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige, 4°.

CHLOROPICUS CANUS (Gmel.)



CHLOROPIC le VAILLANT (Malh.) fig. 1, mâle, encore jeune; f. 2, femelle, ad. CHLOROPICUS VAILLANTII (Malh.) f. 3, j. mâle de l'année; f. 4, rémige 4°.




CHLOROPIC MULTIBANDE (Malh.) f. 1, mâle; f. 2 femelle; f. 3, rémige, 4°. CHLOROPIC CAPISTRATE (Ex-natt.) f. 4, mâle, f. 5, femelle; f. 6, rémige, 4°.

CHLOROPICUS POLYZONUS (Temm.)
CHLOROPICUS CAPISTRATUS (Natt.)




CHLOROPIC CHRYSOCHLORE (Vieill.) fig. 1, mâle, f. 2, femelle, f. 3, rémige, 4°CHLOROPICUS CHRYSOCHLORUS (Vieill) CHLOROPIC BRUN-DORÉ (Ex-vieill) f. 4, mâle; f. 5, femelle, f. 6, rémige, 4°CHLOROPICUS AURULENTUS (Illig.)



CHLOROPIC DU BRÉSIL sig. 1, mâle; sig. 2, semelle CHLOROPIC D'ISIDORE (Malh) sig. 3, mâle; sig. 4 semelle. sig. 5, rémige 4 secondaire.

CHLOROPICUS BRASILIENSIS (Sw.)
CHLOROPICUS LEUCOLŒMUS (Natt)

Lith Compan rue Rousselet N.º15. Paris



Mesnel del et alth

A Matherhe direx

CHLOROPIC POIGNARDÉ (Temm.) fig.1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4°.

CHLOROPIC à GORGE JAUNE (Malh.) f. 4, mâle; f. 5, vieux mâle; f. 6, femelle; f. 7, rémige. 4°.

CHLOROPICUS PERCUSSUS (Temm.)

CHLOROPICUS CHLOROCEPHALUS (Gmel).




CHLOROPIG à GORGE ROUGE (Malh) fig 1, mâle; f.2, femelle, f. 3, rémige 4 e CHLOROPIG de CAYENNE (ex Valenc) f. 4 et 5, mâles; SPECIOSUS (Sclat) f 6. lemelle; f.7, rémige 4

CHLOROPICUS ERYTHROPSIS (ex Vieill Bonap) CHLOROPICUS CAYENNENSIS (ex Gmel)



CHRYSOPIC CHLORIS (Malh.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle, f. 3, rémige 4°. CHRYSOPIC MELANOCHLORE (Malh.) f. 4, mâle; f. 5, femelle, f. 6, rémige 4°.

CHRYSOPICUS CHLOROSOSTUS(Wagl)
CHRYSOPICUS MELANOCHLORUS(Gmel)



Mesnel, del et Lith.

A. Malherbe,  $direx^t$ 

### PL.LXXXIX



E (Malh) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4º ex Swain) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4º ex Swain) f. 7, mâle; f. 8, femelle; f. 9, rémige, 4º ex Swain f. 8, femelle; f. 9, femell

CHRYSOPICUS CHRYSOMELAS (Malh.)
CHRYSOPICUS RUBIGINOSUS (Swain.)
CHRYSOPICUS MELANOLAEMUS (Malh.)



CHRYSOPIC CERUGINEUX f. 1, mâle; f. 8, femelle, f 3, rémige 4.º
CHRYSOPIC GRISONNANT (Malh.) f. 4, mâle, f. 5, femelle, f. 6, autre mâle, f. 3, rémige 4.º

CHRYSOPICUS ŒRUGINOSUS (Licht.)
CHRYSOPICUS CANIPILEUS (Lafren & d'Orb.)

Paris, Lith A. Compan, r Rousselet, 15.



Mesnel del et Lith

A.Malberhe direx."

CHRYSOPIC (Malh) du GABON fig.1, mâle; fig.2. femelle; f.3. rèmige 4º CHRYSOPIC du PRINCE CHARLES f 4 mâle; f 5, remige 4º CHRYSOPIC à BEC COURT f.6, mâle; f 7. femelle.f.8. rémige 4º

CHRYSOPICUS GABONENSIS (Malh ex Verreaux)
CHRYSOPICUS CAROLI (Malh)
CHRYSOPICUS BRACHYRHYNCHUS (Swains)



CHRYSOPIC NEIGEUX (Malh ex Sw.) fig. 1, mâle.; f 2, femelle.

CHROSOPIC à DOS VERT f. 3. femelle.

CHRYSOPIC POINTILLE (Malh) f. 4 mâle: f 5 femelle; f. 6. jeune femelle; f. 7 remige 4.

CHRYSOPICUS NIVOSUS (Swain)
CHRYSOPICUS CHLORONOTUS (Val.)
CHRYSOPICUS PUNCTILICERUS (Wağl.)



Mesnel del et Lith

A. Malherbe. direx +

CHRYSOPIC (Malh) de BRUCE fig. 1. mâle
CHRYSOPIC Tachelé de NUBIE (Buff.) lig 2, mâle f 3. femelle.

fig 4 Jeune mâle; f. 5. Jeune femelle; f.6. remige 4.6

Lith Compan rue Rousselet Nº15, Paris

CHRYSOPICUS BRUCEI (Malh) CHRYSOPICUS NUBICUS (Wagl)



Mesnel del et Lith.

CHRYSOPIC MOUCHETÉ (Malh) fig.1, mâle, f.2, femelle.
MELAMPIC A COLLIER, f.3. jeune femelle; (Malh)

A.Malherbe direx!

CHRYSOPICUS PERSPICILLATUS (Liceht) MÉLAMPICUS TORQUATUS.




CHRYSOPIC D'ABINGTON fig 1 mâle; f.2. femelle. f. 3. rémige. 4° CHRYSOPIC TIGRÉ (Le Vaill.) fig. 4 mâle; f.5. femelle; f.6. rémige 4°

CHRYSOPICUS ABINCONI (Smith)
CHRYSOPICUS NOTATUS (Licht)



MELAMPIC LEWIS (Wils) fig. 1 vieux mâle; f. 2, id femelle; f. 3, mâle, ad, f. 4 femelle ad f. 5 jeune femelle

MELAMPICUS TORQUATUS (Audub)



MELAMPIC ERYTRHOCEPHALE (Malh'ex Linn) fig. 1 mâle ad 12 et 3 jeunes femelles . 14 remige 4.º MELAMPIC DE PORTO-RICO (Maugé) f. 5. mâle ; f. 6 rémige 4.º

MELAMPICUS ERITHROCEPHALUS
MELAMPICUS PORTO-RICENSIS (Daubin.)



Mesnel del et Lith

A Malherbe direx

MELAMPIC A FRONT ROUCE (Spix) fig. 1. mâle; f. 2, femelle; f. 3. rémge 4.º MELAMPIC HIRONDINACE (Drap) f 4 mâle; f. 5. femelle.

f. 6. jeune mâle; f. 7. rémige 4.º

MELAMPICUS RUBRIRONS (Spix)
MELAMPICUS HIRUNDINACEUS (Gmel):



MÉLAMPIC FORMICIVORE (Less) fig. 1. mâle; f. 2. femelle; f. 3 j femelle: f. 4. remige 4 °. MÉLAMPIC A GORGE JAUNE (Malh) f. 5. mâle f. 6 femelle; f. 4 remige 4 °.

MELAMPICUS FORMICIVORUS (MELAMPICUS FLAVIGULA (Natter)



MÉLAMPIC L'HERMINIER (Less) fig. 1.

MÉLAMPIC A FRONT JAUNE(Vieil) fig 2 & 3 mâles. f4 femelle; f 5 remige 4 e
MÉLAMPIC A GORGE CITRINE (Malh.) f 6 mâle

MELAMPICUS HERMINIERI (Less)
MELAMPICUS FLAVIRONS
MELAMPICUS XANTHOLARYNX(Rach)



MELAMPIC DOMINICAIN (Malh ex Vieill) f. 1 mâle. f. 2 femelle, XENOPIC A MASQUE BLANC (Malh) f. 3 mâle f. 4 femelle; f. 5 rémige 4 º

MELAMPICUS DOMINICANUS (Vieil)
XENOPICUS ALBOLARVATUS (Cassin)



Mesnel del et Lith.

SEBRAPICUS SUPERCILIARIS (Temm) id id

PIC-ZÈBRE SUPERCILIAIRE (Malh ex Temm) fig. 1 mâle; f. 2. femelle; f. 3 rémige, 4 e id Variété blanche fig. 4.

PIC-ZEBRE FLÉGANT (ex Swain) f. 5 mâle. f. 6. femelle; f. 7, rémige 4 e

ZEBRAPICUS ELEGANS (Svainn.)

A Malherbe dirext



Mesnel del et Lith

PIC-ZÈBRE PUCHERAND (Malh) fig. 1 male; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4.º
PIC-ZÈBRE ALEXAN CENDRÉ (Malh) fig. 4 male; f. 5 femelle; f. 6 rémige 4.º
PIC-ZÈBRE CAROLIN (Val.) f. 7, male; f. 8, femelle; f. 9 rémige 4.º

ZEBRAPICUS PUCHERANI (Malh) ZEBRAPICUS HYPOPOLIUS (Malh) ZEBRAPICUS CAROLINUS (Linn)

A Malherbe direx!



PIC-ZÈBRE à FRONT D'OR (Malh.ex Licht.) f. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, j. mâle; f. 4, rémige 4. ZEBRAPICUS AURIFRONS (Licht.) PIC-ZÈBRE de la JAMAÏQUE (Buff.) f. 5, mâle; f. 6, femelle; f. 7, rémige 4. ZEBRAPICUS RADIOLATUS (Wagl.)



Mesnel, del & Lith.

A. Malherbe, dirext

PIC-ZÈBRE AUX YEUX ROUGES (Malh.ex.Lich.) f. 1, mâle; f. 2, femelle, f. 3, remige 4°. ZEBRAPICUS ERYTHROPHTHALMUS (Licht) PIC-ZEBRE DE SANTA-CRUZ. (Ex Bonap.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4°.

 ${\tt ZEBRAPICUS\ SANTA-CRUZI\, (B\'{o}nap.)}$ 



PIC-ZÈBRE TRICOLOR (Wagl.) f. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4º. PIC-ZÈBRE DE KAUP (Bonap.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4º.

ZEBRAPICUS TRICOLOR (Wagl.)
ZEBRAPICUS KAUPII (Bonap.)



Mesnel, del & Lith.

A . Malherbe, direx  $^t$ 

PIC-ZÈBRE à VENTRE SANGUIN (Swains.) f.1, mâle.
PIC-ZÈBRE de St DOMINGUE (Malh.) f.2, mâle, f.3, mâle encore jeune.

ZEBRAPICUS RUBRIVENTRIS (Swains.)
ZEBRAPICUS STRIATUS (Gmel.)



GÉOPIC CHAMPÊTRE (Malh.) f. 1, mâle; f. 2, femelle, f. 3, rémige 4°. 2ÉOPIC AGRICOLE (Malh.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige, 4°.

GEOPICUS CAMPESTRIS (Wagl.)
GEOPICUS AGRICOLA (Malh.)



Mesnel, del et Lith.

GÉOPIC CHRYSOÏDE (Malh.) f.1, j. mâle; f.2, queue; f.3, aile f.4, femelle.

GÉOPIC DORÉ (Ex-vieill.) f.5, mâle, f.6, femelle, f.7, j. mâle.

A. Malherbe, dirext
GEOPICUS CHRYSOÏDES (Malh.)
GEOPICUS AURATUS (Linn.)



Mesnel, del et Lith.

GÉOPIC MEXICANOIDE (Lafres) f. 1, mâle; f. 2, j. femelle; f. 3, rémige 4°.

CLOPIC MEXICAIN (Malh. ex Less.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 3, rémige 4°.

A. Malherbe, direx $^t$ .

GEOPICUS RUBICATUS (Wagl.)
GEOPICUS MEXICANUS (Swains)




Mesnel, del et Lith.

GÉOPIC LABOUREUR (Levail.) f. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4.º.

GÉOPIC CHILIEN (Ex-Less.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4.º.

A . Malherbe,  $direx^t$ 

GEOPICUS ARATOR (G. Cuv.)
GEOPICUS CHILENSIS (Garnot et Less.)



Mesnel, del et Lith.

GÉOPIC RIVOLI (Malh.) f. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, j. mâle; f. 4, j. femelle; f. 5, rémige 4°.

A . Malherbe, direx $^t$ 

GEOPICUS RIVOLII (Boiss.)



Mesnel, del et Lith.

GÉOPIC des ROCHERS (d'Orb.) f. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, remige 4.º GÉOPIC FERNANDO (Ex R. de la Sagra) f. 4, mâle; f. 5, femelle.

A.Malherbe, dirext

GEOPICUS RUPICOLA
GEOPICUS FERNANDINAE (Vig.)



Mesnel del et Lith.

CHRYSOPIC MOUCHETÉ (Malh) fig.1, mâle, f.2, femelle.
MELAMPIC A COLLIER, f.3, jeune femelle; (Malh)

A.Malherbe direx



Mesnel, del et Lith.

PICUMNOÏDE ABNORME (Temm.) f. 1, femelle.

PICUMNE TACHETÉ DE BLANC (d'Orb.) f. 2, mâle,

PICUMNE PYGMÉ (Licht.) f. 3, mâle; f. 4, femelle; f. 5, j. mâle

A. Malherbe, dirext

PICUMNOÏDES ABNORMIS.
PICUMNUS ALBO SQUAMATUS.
PICUMNUS PYGMŒUS.



Mesnel delet Lith

A Malherbe direx!

PICUMNE TEMMINCK.(Lafres) fig. 1. mâle, f.2, femelle.

PICUMNE DÉLIÉ (Malh) f.3. mâle, f.4 femelle.

PICUMNE DE BUff ON (Lafres) f.5, mâle, f.6, femelle.

PICUMNUS TEMMINKII.
PICUMNUS EXILIS.(Lafres)
PICUMNUS BUFFONII.



Mesnel del et Lith.

A.Malherbe direx!

PICUMNE CASTELNEAU îg1 mâle, f.2. j. mâle. PICUMNE SQUAMULÉ îg. 3, male, f.4 femelle PICUMNE INNOMÉ f5, mâle f.6, femelle.

PICUMNUS CASTELNEAU.
PICUMNUS SQUAMULATUS (Lafres)
PICUMNUS INNOMINATUS (Burton)



Mesnel, del et Lilh,

A Malherhe direx:

PICUMNE VERREAU (Malh) f.1, femelle.

PICUMNE A VENTRE ROUX (Malh) f.2, femelle

PICUMNE GRENADIN f.3, femelle.

PICUMNE LAFRESNAYEUNER) f.4, male. f.5, femelle.

PICUMNUS VERREAUXII (Malh)
PICUMNUS RUFIVENTRIS (Bonap)
PICUMNUS GRANADENSIS (Laf)
PICUMNUS LAFRESNAYI (Malh)



Mesnel, del & Lith.

A. Malherbe, dirext

PICUMNE, fig. 1, mâle; f. 2, femelle.

PICUMNE A GOUTELETTES, f. 3, femelle.

PICUMNE VERMILLON, f 4, mâle; f. 5, femelle.

PICUMNUS HYPOXANTHUS (Reich.)
PICUMNUS GUTTATUS (Reich.)
PICUMNUS CINNAMOMEUS (Reich.)



PICUMNE DE CAYENNE, fig. 1, mâle, f2, femelle, f.3, Jeune mâle. PICUMNE OLIVATRE, fig 4 et 5, mâles, f.6, femelle

PICUMNUS CAYENNENSIS. PICUMNUS OLIVACEUS



Mesnel, del et Lith.

TORCOL à PLASTRON, f. 1.
TORCOL de L'EQUATEUR, f. 2.
TORCOL de L'INDE, f. 3.
TORCOL VERTICILLE, f. 4.

A. Malherbe, dirext

YUNX PECTORALIS.
YUNX AEQUATORIALIS.
YUNX INDICA.
YUNX TCRQUILLA.

